



## HANTAVIRUS

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave causada por el virus Hanta. Los reservorios y transmisores son los ratones silvestres,

Se transmite por a través de la saliva, orina o heces de los ratones infectados.

Ingresa al organismo:

- > Por inhalación: cuando respiramos en lugares como huertas, galpones, pastizales, donde los roedores infectados desprendieron el virus,
- > Por contacto directo: al tocar roedores vivos o muertos infectados, o su orina y/o heces,
- > Por mordedura de roedores infectados.
- > Por contacto estrecho con personas enfermas, durante los primeros días de síntomas, a través de las vías aéreas.

### Síntomas:

Es parecido a un estado gripal fuerte: con tos, fiebre, dolores musculares y de cabeza, escalofríos.

También puede producir náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

Después de algunos días puede agravarse y producir el "síndrome cardiopulmonar por hantavirus", que puede llevar a la muerte si la persona no es internada a tiempo.

**ANTE CUALQUIER SÍNTOMA NO TE AUTOMEDIQUES**

**No existe un tratamiento específico, Aquellas personas con síntomas avanzados, deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios.**

## ¿CÓMO PREVENIR?

### Es importante:

- > Evitar el contacto con roedores y sus secreciones.
- > Impedir que los roedores entren y hagan nidos en las casas, tapando orificios en puertas y ventanas, paredes y cañerías.
- > Limpiar pisos paredes, puertas, mesas y alacenas con una parte de lavandina cada nueve partes de agua (se debe dejar actuar por 30 minutos antes de enjuagar)
- > Humedecer el piso antes de barrer para que no se levante polvo.
- > Mantener el pasto corto y libre de malezas.
- > Alejar huertas y leñeros, por lo menos a 30 metros de las viviendas.
- > Ventilar espacios como galpones que hayan estado cerrados, durante por lo menos 30 minutos antes de ingresar y usar cubrebocas al entrar.
- > Acampar lejos de malezas y basurales y no dormir sobre el suelo.
- > Asegurarse de que el agua que se consume sea potable.
- > Si se encuentra un roedor muerto, rociarlo con lavandina junto con lo que haya podido estar en contacto, y después de 30 minutos, enterrarlo o quemarlo.
- > Evitar el contacto con personas que tengan síntomas o pudieron estar en contacto con el virus.